

Утверждено: Государственный Центр Экспертизы и Стандартизации лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинского оборудования Министерства Здравоохранения Республики Узбекистан

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПАНТОГАМ

Действующее вещество (МНН): гопантенная кислота

Лекарственная форма: таблетки.

Состав:

1 таблетка содержит:

активное вещество: D,L-Гопантенная кислота 300 мг

вспомогательные вещества МКЦ — 20,97 мг; магния стеарат — 1,53 мг

Описание: *твердые желатиновые капсулы.*

Фармакотерапевтическая группа: ноотропное средство.

Код АТХ: N06BX.

Фармакодинамика

Действие препарата Пантогам актив связано с наличием в его структуре ГАМК, которая непосредственно воздействует на ГАМК_B-рецептор- канальный комплекс. Препарат Пантогам актив представляет собой рацемическую смесь равных количеств R-формы гопантенной кислоты и ее S-изомера. Присутствие изомера улучшает транспорт и взаимодействие препарата с рецептором ГАМК. Препарат Пантогам актив обладает более выраженным ноотропным и противосудорожным действием, по сравнению с препаратами гопантенной кислоты первого поколения.

Препарат Пантогам актив повышает устойчивость мозга к гипоксии и воздействию токсических веществ, стимулирует анаболические процессы в нейронах, сочетает умеренное седативное действие с мягким стимулирующим эффектом. Обладает антиастеническим и легким противотревожным действием. Уменьшает моторную возбудимость, упорядочивает поведение. Активирует умственную деятельность и работоспособность. Вызывает торможение патологически повышенного пузырного рефлекса и тонуса детрузора.

Фармакокинетика

Быстро всасывается из ЖКТ. Проникает через ГЭБ. Не метаболизируется и выводится в неизменном виде в течение 48 ч: около 70% от принятой дозы — с мочой, около 30% — с калом.

Показания к применению

когнитивные нарушения при органических поражениях головного мозга (в т.ч. последствия нейроинфекций и черепно-мозговых травм) и невротических расстройствах;

цереброваскулярная недостаточность, вызванная атеросклеротическими изменениями сосудов головного мозга;

экстрапирамидные гиперкинезы (в т.ч. миоклонус-эпилепсия, хорея Гентингтона, гепатолентикулярная дегенерация, болезнь Паркинсона), лечение экстрапирамидного синдрома, вызванного приемом нейролептиков;

эпилепсия (совместно с противосудорожными средствами);

психоэмоциональные перегрузки, снижение умственной и физической работоспособности, для улучшения концентрации внимания и запоминания;

нейрогенные расстройства мочеиспускания (поллакиурия, императивные позывы, императивное недержание мочи, энурез);

шизофрения (в составе комплексной терапии).

Способ применения и дозы

Внутрь, через 15–20 мин после еды по 1–3 капс. (0,3–0,9 г) 2–3 раза в день предпочтительно в утренние и дневные часы.

Максимальная суточная доза — 8 капс. (2,4 г).

Курс лечения — 1–4 мес, иногда до 6–12 мес. Через 3–6 мес возможно проведение повторного курса лечения.

Побочные действия

Нежелательные реакции, представленные ниже, перечислены в соответствии с поражением органов и систем и частотой встречаемости. Частота встречаемости определяется следующим образом: очень часто ($\geq 1/10$); часто ($\geq 1/100$ и $< 1/10$); нечасто ($\geq 1/1000$ и $< 1/100$); редко ($\geq 1/10000$ и $< 1/1000$); очень редко ($< 1/10000$, включая отдельные случаи).

Со стороны иммунной системы: редко — аллергические реакции (ринит, конъюнктивит, кожные высыпания).

Психические нарушения: редко — нарушения сна; очень редко — сонливость.

Со стороны нервной системы: редко — головная боль; очень редко — головокружение, шум в голове.

Желудочно-кишечные нарушения: редко — тошнота, боль в эпигастрии.

В случае возникновения нарушений со стороны иммунной системы отменяют препарат. В остальных случаях уменьшают дозу препарата.

Противопоказания

Гиперчувствительность, детям до 18 лет, острые тяжёлые заболевания почек, беременность, лактация.

Лекарственные взаимодействия

Пантогам пролонгирует действие барбитуратов, усиливает эффекты противосудорожных средств; предотвращает побочные явления фенobarбитала, карбамазепина, нейролептиков.

Эффект препарата Пантогам® усиливается при одновременном применении с глицином, этидроновой кислотой.

Пантогам потенцирует действие местных анестетиков (прокаина).

Особые указания

В условиях длительного лечения не рекомендуется одновременное назначение препарата с другими ноотропными и стимулирующими ЦНС средствами.

Передозировка

Усиление симптоматики побочных явлений (нарушения сна или сонливость, шум в голове).

Лечение активированный уголь, промывание желудка, симптоматическая терапия.

Форма выпуска

Капсулы, 300 мг. По 10 или 15 капс. в контурной ячейковой упаковке из пленки ПВХ и фольги алюминиевой печатной лакированной. 2 или 4 контурные ячейковые упаковки по 15 капсул

Условия хранения

В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25°C. Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года. Не использовать после окончания срока годности.

Условия отпуска из аптек .

По рецепту.

Производитель

ООО «ПИК-ФАРМА», Российская Федерация. 125047, г. Москва, пер. Оружейный, д. 25, стр. 1.

Произведено ООО «ПИК-ФАРМА ЛПК», Российская Федерация, 308570, Белгородская обл.. Белгородский район, пос. Северный-Первый. ул. Березовая, д. 46г.

Организация, принимающая претензии

ООО «ПИК-ФАРМА». Телефон/факс:

(495) 925-57-00. www.pantogam.ru